


# ¿Es la prueba de detección de cáncer de próstata correcta para usted?



## ¿QUIÉN ESTÁ EN RIESGO DE DESARROLLAR CÁNCER DE PRÓSTATA?

El cáncer de próstata es el segundo cáncer más común en los hombres y la segunda causa principal de muerte por cáncer en hombres. Uno de cada siete hombres será diagnosticado en su vida. Los hombres afroamericanos y los hombres con un historial familiar de cáncer de próstata tienen una probabilidad más alta de sufrir la enfermedad. El cáncer de próstata es diferente a varios tipos de cáncer porque a menudo crece muy lentamente y es posible que no cause problemas. En el 2014, más de 233,000 hombres fueron diagnosticados con cáncer de próstata y solamente alrededor de 29,500 hombres estadounidenses morirán a causa de la enfermedad. Varios hombres con cáncer de próstata nunca sabrán que lo tienen a menos que se sometan a las pruebas.

## ¿ME DEBO REALIZAR UNA PRUEBA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA?

EXISTEN POSIBLES BENEFICIOS AL REALIZARSE UNA PRUEBA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS).

- Una prueba de PSA normal puede ayudarle a tranquilizarse.
- Una prueba de PSA puede detectar el cáncer de próstata en etapa temprana antes de que se haya propagado.
- Un tratamiento temprano del cáncer de próstata puede ayudar a algunos hombres a evitar problemas ocasionados por el cáncer.
- Un tratamiento temprano del cáncer de próstata puede ayudar a algunos hombres a vivir más tiempo.

## EXISTEN POSIBLES RIESGOS AL REALIZARSE UNA PRUEBA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO ESPECÍFICO (PSA).

- Una prueba de PSA normal puede omitir algunos tipos de cáncer de próstata (un "falso negativo").
- Algunas veces los resultados de la prueba sugieren que hay algo mal cuando en realidad no lo hay (un "falso positivo"). Esto puede causar una preocupación y estrés innecesarios.
- Una prueba de PSA con resultado "falso positivo" puede ocasionar una biopsia (muestra de tejido) de próstata, innecesaria.
- Una prueba de PSA alto puede detectar un cáncer de próstata que está creciendo despacio y que nunca le habría causado problemas.
- El tratamiento de cáncer de próstata puede causarle daños. Pueden ocurrir problemas para lograr erecciones, goteo de orina o problemas de la función intestinal.
- De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Urología, en los hombres asintomáticos, el mayor beneficio de las pruebas de detección rutinarias se puede encontrar en los hombres entre 55 y 69 años de edad. Los hombres menores de 55 o mayores de 69 que estén preocupados por sus factores de riesgo personal deben hablar con su proveedor de atención médica para determinar si la prueba de detección de cáncer de próstata es apropiada.



American  
Urological  
Association

*Urology Care*  
FOUNDATION™  
The Official Foundation of the  
American Urological Association